

藥品使用指導單

暢寧®錠 (Cetia[®] 10 mg)

■ 藥品成分名

Cetirizine hydrochloride

■ 藥品外觀

白色，長圓柱形，錠劑；大小：1.00 公分；標記：[S，T] [281]

■ 作用

暢寧®錠為口服的抗過敏治療劑，用於治療過敏性或季節性鼻炎、蕁麻疹，過敏性搔癢、過敏性結膜炎等現象。

■ 用法

- 成人及三歲以上孩童適用。
- 可於飯前或是飯後服用！
- 每日服用一次的話，可於晚餐或睡前一次服用；或分別於早晚兩次服用一半劑量！

■ 注意事項

- 對中樞神經沒有作用，較不易產生安眠及行為異常等現象，但仍須小心使用，避免因嗜睡等現象而有跌倒情形發生。
- 此藥會被排泄於乳汁中，授乳婦不可使用本藥。
- 孕婦應避免使用本藥。
- 從事駕駛及操作機械者，請小心。
- 服用期間避免喝酒。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

可能引起短暫輕微的副作用，例如：頭痛、眩暈、嗜眠、口乾、胃腸不舒服。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

■ 服用過量怎麼辦？

單次服用超過五顆以上（包含 5 顆），會有安眠的情形發生。請儘速就醫進行灌腸及一般急救法處理。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.11.01
- PFS-7200-0118

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮