

# 藥品使用指導單

## 寧司泰定®膠囊 (Nystatin® 500,000 U)

### ■ 藥品成分名

Nystatin

### ■ 藥品外觀

暗紅色/粉紅色，膠囊；大小：0.7 公分；標記：[YSP NYC]

### ■ 作用

寧司泰定®膠囊為口服的抗黴菌製劑，主要用來預防及治療念珠菌感染。當廣效性抗生素或類固醇治療時併用作為念珠菌過度增生的預防性療法。

### ■ 用法

- 請按照醫生的指示服用。
- 可於飯前或是飯後服用。
- 若為預防或治療口腔感染，可將寧司泰定®膠囊打開，把粉末加入蒸餾水、生理食鹽水或 50% 葡萄糖溶液中作為漱口水。
- 泡製完請放冰箱冷藏，使用前請將溶液搖動均勻。

### ■ 注意事項

- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎功能不良等疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 抗生素類藥物需服用一個完整療程，請依照醫師指示服用，不可中途自行停藥。
- 請勿與制酸劑同時服用。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：噁心、嘔吐、便秘、腹瀉、頭暈。
- 當上述的症狀若持續且加重，請立即就醫！

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。泡製成漱口水時保存期限為一個星期。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.11.01
- PFS-7200-0124

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮