

# 藥品使用指導單

## 抑癌<sup>®</sup>膠囊 (Estracyt<sup>®</sup> 140 mg)

### ■ 藥品成分名

Estramustine phosphate

### ■ 藥品外觀

白色膠囊；標記：[ESTRACYT；KPh750]

### ■ 作用

抑癌<sup>®</sup>膠囊為一種治療攝護腺癌的藥品。

### ■ 用法

此藥每天服用兩次，空腹使用，請依照醫師指示的時間服用。

### ■ 注意事項

- 若您對於此類藥物或任何其他藥物過敏，請告知您的醫（藥）師。
- 若您有心血管疾病、糖尿病、腎功能或肝功能不良，請告知您的醫（藥）師。
- 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受化療期間或化療之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
- 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：噁心及嘔吐、水腫、虛弱、疲倦、頭暈、禿髮、失眠、皮膚乾癢。這些症狀會隨時間慢慢減弱。
- 若有下述症狀,請立刻通知您的醫師：嚴重腹瀉、手或腳紅腫、麻木或疼痛、發燒、寒顫、喉嚨痛、胸痛、發疹、食慾降低、嚴重嘔吐等。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.11.01
- PFS-7200-0127

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮