

# 藥品使用指導單

## 癌伏妥<sup>®</sup>錠 (Afinitor<sup>®</sup> 5 mg)

### ■ 藥品成分名

Everolimus

### ■ 藥品外觀

白色，長柱形，錠劑；標記：[5][NVR]

### ■ 作用

癌伏妥為一種抗腫瘤藥物，能殺死癌細胞而用來治療癌症。一般主用於腎細胞癌。

### ■ 用法

1. 請遵照醫師指示服用，勿任意更改劑量或停藥。
2. 可隨餐服用，亦可空腹服用；若出現胃部不適可與食物併服。
3. 藥錠不可咀嚼或咬碎。

### ■ 注意事項

1. 若您對於此類藥物或任何其他藥物過敏，請告知您的醫（藥）師。
2. 有肝臟、腎臟疾病，或有糖尿病以及高血脂，應告知您的醫（藥）師。
3. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
4. 盡量避免或減少含酒精性飲料的攝取，避免飲用大量葡萄柚汁，以免影響藥品的代謝及療效。
5. 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
6. 若您有服用以下藥物，如：Ketoconazole、Erythromycin、Verapamil、Rifampicin 等等，請在服用這些藥物前告知您的醫師。
7. 若您有要施打任何疫苗（如：麻疹或流行感冒疫苗），請先告知您的醫師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

1. 使用本藥後可能會造成口角炎，請注意口腔衛生並避免使用含酒精等較為刺激的漱口水。
2. 使用本藥後可能比較容易出血，所以必須小心避免受傷；建議使用軟毛牙刷和電動刮鬍刀，以避免皮膚和牙齦出血。
3. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知您的醫師：皮膚起紅疹、糞便或尿液顏色變深、肌肉痠痛、噁心嘔吐、食慾不振、胃痛、腹瀉、咳嗽、寒顫、喉嚨痛、落髮、頭痛、口乾、手腳疼痛、水腫、舌頭麻、味覺改變。

## ■ 保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.11.01
- PFS-7200-0134

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮