

# 藥品使用指導單

## 百無凝<sup>®</sup>膜衣錠 (Brilinta<sup>®</sup> 90 mg)

### ■ 藥品成分名

Ticagrelor

### ■ 藥品外觀

黃色、雙凸圓形，錠劑；大小：0.9 cm；標記：[90，T]

### ■ 作用

百無凝<sup>®</sup>膜衣錠是一種抗血小板藥，可以防止血栓形成，減少血管阻塞的危險。

### ■ 用法

一般每天口服兩次（早晚各一次），依照醫師指示用藥，每天的服藥時間盡量保持固定，可於飯前或是飯後服用。

### ■ 注意事項

1. 盡量避免含酒精性飲料和葡萄柚汁的攝取，還有降血脂藥物也不要同時服用，若不確定其他藥品是否會與百無凝產生交互作用時，請詢問醫師或藥師。
2. 服藥前，請確實告知醫師是否曾有出血問題（不正常瘀血或流鼻血現象或經期過長）、糖尿病、肝疾病、高血壓、癲癇、關節炎、甲狀腺機能異常、藥物過敏等問題。
3. 若已懷孕或計畫懷孕，請告知醫師。
4. 讓所有照顧您的醫療人員知道您正服用此藥。
5. 應盡量避免從事易引起外傷之危險活動。
6. 避免割傷自己，小心使用牙刷或刮鬍刀，盡量選擇軟毛牙刷或電動刮鬍刀。
7. 確定身邊有足夠藥量，並遵循醫師指示服藥。
8. 請勿自行更換不同廠牌之藥品。
9. 若不小心服用過量，請立即告知您的主治醫師或就近就醫。
10. 若有不正常出血情況（如鼻出血、糞便顏色突然變深或刷牙有血絲等），請立即告知您的主治醫師或就近就醫。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

11. 若有些微呼吸不順暢屬正常副作用，但若很嚴重至呼吸阻塞或呼吸困難請立即告知您的主治醫師或就近就醫。
12. 若要動手術，需告知醫師您正服用此藥，可能需要停藥。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

### ■ 保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處（30℃以下）、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.11.01
- PFS-7200-0137

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮