

藥品使用指導單

替您坦舒® 持續釋放膠囊 (Tamsos SR® 0.2 mg)

■ 藥品成分名

Tamsulosin

■ 藥品外觀

粉紅/白色，長圓柱形，硬膠囊；標記：[UC；21][UC；21]

■ 作用

替您坦舒® 持續釋放膠囊主要作用在尿道、膀胱及前列腺，以改善因前列腺肥大致生的排尿障礙。

■ 用法

1. 口服，可於空腹、飯後或睡前服用。
2. 本品為持續釋放膠囊，請勿打開、破壞、磨碎膠囊，以免造成藥品持續釋放效果受到影響，可能發生姿勢性低血壓。

■ 注意事項

1. 服藥後若感到異常疲倦、昏厥、意識不明、黃疸，請立刻停藥並告知您的醫生及藥師。
2. 本藥品服用後可能引起眩暈，若操作危險重機械、高處危險作業，請謹慎小心。另外本品對曾經有姿勢性低血壓患者有症狀惡化的風險，請轉換姿勢時注意放慢動作，避免危險。
3. 肝或腎功能不全患者、哺乳或懷孕婦女，請事先告知醫師。
4. 若您需要使用其他藥物、健康食品，請事先告知您的醫師及藥師，避免食物、藥物的交互作用。
5. 若發現有蕁麻疹、皮膚搔癢、胃部不適，請回診告知醫師及藥師進行調整。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 107.11.01
- PFS-7200-0139

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮