

藥品使用指導單

斥消靈[®]錠 (Rapamune[®] 1 mg)

■ 藥品成分名

Sirolimus

■ 藥品外觀

白色，三角形錠劑，標記：RAPAMUNE 1 mg

■ 作用

與 Cyclosporin 及皮質類固醇合併使用來預防病人腎臟移植後之器官排斥。

■ 用法

1. 一般每天口服一次，依照醫師指示用藥，由於食物會影響藥物的吸收，所以每天的服藥時間需固定（飯前或飯後），您可能須長期服用，甚至一輩子，切勿擅自停藥或更改劑量。
2. 如果需同時服用 Sandimmun[®] (新體睦[®]) 時，本藥應在新體睦[®]服用後四小時才可服用。

■ 注意事項

1. 服用斥消靈[®]錠請配大量開水整粒吞服，不可嚼碎。
2. 服藥時，請勿與含葡萄柚汁的飲料併服。
3. 服藥期間請保持規則飲食習慣，並固定飲食類型。
4. 為使藥品達到最佳療效及減少副作用，服藥期間醫師會視情況定期監測腎功能及藥品血中濃度（一般為服藥前濃度）。
5. 免疫抑制劑是器官移植不可或缺的藥品，他們可延長新植入的器官壽命、預防排斥作用。因此為了維持器官功能及減少藥物的不良反應，請移植病人確實遵從醫囑並密切注意身體異樣。
6. 許多的藥物、保健食品、中草藥會增加或降低本藥的藥效，所以使用本藥前請先告知醫生您正在使用的處方藥或非處方藥。
7. 服用本類藥品會使您的抵抗力較弱，因此應避免和有感染的人接觸。如有任何類似感冒症狀如發燒；喉嚨痛、發冷、頻尿、解便困難等，請立即就醫。
8. 確定有足夠藥量，特別是要去度假時。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

9. 勿自行停藥。
10. 服用此藥請勿授乳；服用此藥應避免懷孕，若可能懷孕請告知醫生，建議婦女服用本藥期間及停止治療後十二周內應採有效的避孕措施。
11. 在服用本藥期間應避免接種活菌疫苗，如三合一疫苗、口服沙賓疫苗、卡介苗等，以免使疫苗效力下降。

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若在 12 小時以內想起時請儘快服藥，但如果很接近下次服藥時間則不必補服上次劑量，照原來時間服用下一次的劑量。
2. 絕不可一次服用雙倍劑量。
3. 如忘記兩劑以上，請告知醫生。

■ 可能的副作用

症狀	如何處理
胸痛、發燒、發冷、喉嚨痛、四肢水腫、暈眩、呼吸困難、不尋常出血或瘀血、血尿、血便、黑便、皮膚紅腫、癢、痛等過敏反應	請立即就醫
腹瀉、便秘、嘔吐、消化不良、頭痛、關節痛、輕微皮疹	若症狀持續且嚴重時，立刻與醫師聯繫
血脂肪升高	可以持續使用，由醫生決定是否要調整劑量，或加服降血脂藥

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.11.01
- PFS-7200-0142

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮