

# 藥品使用指導單

## 糖漸平<sup>®</sup>膜衣錠 (Trajenta<sup>®</sup> 5 mg)

### ■ 藥品成分名

Linagliptin

### ■ 藥品外觀

淺紅色、雙凸圓形錠劑；標記：[D5]

### ■ 作用

為口服的抗糖尿病製劑，主要用於輔助治療第二型糖尿病，以控制您的血糖接近正常值。

### ■ 用法

按照醫生的指示服用。

### ■ 注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有其他疾病、正準備手術等，應告知您的醫生及藥師。
2. 配合醫生指示控制飲食和適量運動才能有效控制糖尿病症狀，有助於您的健康。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

### ■ 可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用過於緊張。若有下列少見的情形：血管性水腫、異常疲倦、呼吸困難的情形，請立即就醫！
2. 服用可能造成低血糖症狀請小心（請見低血糖症狀處理方法）。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

## ■ 發生低血糖該怎麼辦？

- 症狀：顫抖、心跳加快、冒冷汗、注意力無法集中、異常飢餓、視力模糊、虛弱無力。
- 處理方式：
  1. 血糖值小於 70 mg/dL：立即服用 120-180 毫升果汁或糖果 8-10 顆；15-20 分鐘後測量血糖值。
  2. 血糖值小於 50 mg/dL：立即服用 180-250 毫升果汁或糖果 10-15 顆；15-20 分鐘後測量血糖值。
  3. 若症狀沒有改善，請立即與您的醫師聯絡。
  4. 當低血糖症狀發生時請勿駕車，以免發生危險。

## ■ 發生高血糖該怎麼辦？

- 症狀：例如異常口渴、疲倦、皮膚乾燥、呼吸困難、頻尿、沒胃口等。
- 處理方式：請測量血糖值並立即與您的醫師聯絡。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.11.01
- PFS-7200-0143

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮