

藥品使用指導單

康速龍[®]錠 (Compesolon[®] 5 mg)

■ 藥品成分名

Prednisolone

■ 藥品外觀

白色，圓形，錠劑；大小：1.0 公分；標記：[C|C]

■ 作用

康速龍[®]錠為口服的類固醇製劑，主要用於緩解發炎症狀、調節免疫，以及治療皮質固醇不足的症狀。

■ 用法

請按照醫師指示以足量開水吞服使用。

■ 注意事項

1. 若您有計畫或已懷孕、哺乳、急性感染疾病，請立即回診，告知您的醫生。
2. 康速龍[®]錠可能增加您腸胃道潰瘍、免疫力低下的機會，若有疑似腸胃不適、腸胃出血，或感染症狀時，請務必提早就醫確認及治療。
3. 請依照醫師指示服用藥品，並避免過度鹽份及糖份攝取，避免副作用的發生。
4. 若需使用其他藥物，因可能造成藥物交互作用，請務必告知醫師或藥師進行評估，確認後方可併用。
5. 配合醫生指示服藥，請勿擅自服用或增減劑量，造成疾病控制上的困難。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有下列狀況請勿慌張：頭痛、粉刺、全身無力、月經失調、傷口癒合較慢。
2. 長期服用類固醇可能提高體液滯留及體型改變（俗稱月亮臉、水牛肩）、骨質疏鬆症的風險，若有症狀或顧慮，請務必回診與醫師討論。

■ 保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 107.11.01
- PFS-7200-0145

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮