

藥品使用指導單

得安穩[®]錠 (Diovan[®] 160 or 40 mg)

■ 藥品成分名

Valsartan

■ 藥品外觀

Diovan 160mg：土黃色，橢圓形，錠劑；標記：[DX | DX][NVR]

Diovan 40mg：黃色，橢圓形，錠劑；標記：[D, O][NVR]

■ 作用

治療高血壓症狀、減少蛋白尿

■ 用法

- 劑量及用法因人及因病情而異，請按醫囑指示用藥，勿自行增減藥量或任意停藥。
- 通常每日一次至兩次，於固定時間服用。

■ 注意事項

- 有腎臟疾病或懷孕、哺乳，應告知您的醫生及藥師。
- 本藥會有可能造成低血壓，使用期間請定時量測血壓，以利醫療人員評估與追蹤。
- 本藥會與其他降壓藥產生交互作用，若有需增加其他降壓藥物請務必諮詢醫師或藥師。
- 本藥與其他保鉀型利尿劑、消炎止痛藥、或由腎臟代謝的藥物併用時，請務必提醒醫師或藥師，追蹤副作用發生與否。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，會逐漸緩和：噁心、頭痛、頭暈、全身無力、等症狀。
- 若上述症狀加重，或有以下症狀，請盡快與醫師聯絡：咳嗽超過兩週、嗜睡、心悸、尿量減少、異常水腫問題。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 107.10.30
- PFS-7200-148

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

