

藥品使用指導單

脈優®錠 (Norvasc® 5 mg)

■ 藥品成分名

Amlodipine

■ 藥品外觀

白色，長形八邊形，錠劑；大小：0.90公分；標記：[NVC，5][Pfizer]

■ 作用

控制高血壓症狀

■ 用法

- 劑量及用法因人及因病情而異，請按醫囑指示用藥，勿自行增減藥量或任意停藥。
- 通常每日一次至兩次，於固定時間服用。

■ 注意事項

- 有肝臟疾病或懷孕、哺乳，應告知您的醫生及藥師。
- 本藥會有可能造成低血壓，使用期間請定期量測血壓，以利醫療人員評估與追蹤。
- 本藥會與其他藥物產生交互作用，若有需增加其他藥物請務必諮詢醫師或藥師。
- 葡萄柚或柚類食物可能抑制本藥代謝，請勿過量食用造成低血壓症狀發生。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，會逐漸緩和：噁心、頭痛、頭暈、全身無力、腹痛等症狀。
- 若上述症狀加重，或有以下症狀，請盡快與醫師聯絡：下肢水腫、嗜睡、心悸，黃疸，嚴重肝臟問題。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 107.10.29
- PFS-7200-149

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮