

# 藥品使用指導單

## 高糖優適<sup>®</sup>錠 (Galvus<sup>®</sup> 5 mg)

### ■ 藥品成分名

Vildagliptin

### ■ 藥品外觀

淡黃色，扁平圓形，錠劑；大小：0.8 公分；標記：[NVR][FB]

### ■ 作用

為口服的抗糖尿病製劑，主要用於輔助治療第二型糖尿病，以控制您的血糖接近正常值。

### ■ 用法

- 劑量及用法因人及因病情而異，請按醫囑指示用藥，勿自行增減藥量或任意停藥。
- 通常每日一次至兩次，於固定時間服用。

### ■ 注意事項

- 有懷孕、哺乳，應告知您的醫生及藥師。
- 本藥會有可能造成低血糖，使用期間請定時量測血糖，以利醫療人員評估與追蹤。
- 本藥會與其他降血糖藥物併用，若有增加其他降血糖藥物請務必留意血糖變化。
- 配合醫生指示控制飲食和適量運動才能有效控制糖尿病症狀，有助於您的健康。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，會逐漸緩和：頭痛、噁心、頭暈等症狀。
- 若上述症狀加重，或有以下症狀，請盡快與醫師聯絡：四肢水腫、感冒許久不癒、關節疼痛、異常腹痛、皮膚紅腫過敏等問題。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

## ■ 發生低血糖該怎麼辦？

- 症狀：顫抖、心跳加快、冒冷汗、注意力無法集中、異常飢餓、視力模糊、虛弱無力。
- 處理方式：
  - 1. 血糖值小於 70 mg/dl：立即服用 120-180 毫升果汁或糖果 8-10 顆；15-20 分鐘後測量血糖值。
  - 2. 血糖值小於 50 mg/dl：立即服用 180-250 毫升果汁或糖果 10-15 顆；15-20 分鐘後測量血糖值。
  - 3. 若症狀沒有改善，請立即與您的醫師聯絡。
  - 4. 當低血糖症狀發生時請勿駕車，以免發生危險。

## ■ 發生高血糖該怎麼辦？

- 症狀：例如異常口渴、疲倦、皮膚乾燥、呼吸困難、頻尿、沒胃口等。
- 處理方式：請測量血糖值並立即與您的醫師聯絡。

參考資料：  
藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 107.10.28
- PFS-7200-152

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

