

藥品使用指導單

愛妥糖[®]錠 (Actos[®] 30 mg)

■ 藥品成分名

Pioglitazone

■ 藥品外觀

白色，圓扁形，錠劑；大小：0.7 公分；標記：[30/391]

■ 作用

治療第二型糖尿病，以控制血糖接近正常值。

■ 用法

- 盡量保持在每日同一時間服用，按照醫生的指示服用。
- 可於飯前或是飯後服用。
- 如果是每日服用一次的話，可於早晨服用一次；如果是分成每日兩次服用的話，可於早晨和傍晚各服用一次。

■ 注意事項

- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或有肝、腎、心臟疾病，請主動告知醫生。
- 對具胰島素阻抗而不排卵之停經前婦女，愛妥糖[®]錠可能會造成排卵，因此可能增加懷孕機率，建議採取適當的避孕措施。
- 愛妥糖[®]錠不能使用於患有心臟衰竭狀態第三級或第四級的病人，如果您本身有心臟疾病，請主動告知醫師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 腸胃不適、頭痛、肌肉痛、骨折、咳嗽、流鼻水、打噴嚏、疲倦
- 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：尿液顏色變深、無法解釋的噁心、嘔吐、胃口變差、皮膚或眼睛產生黃疸、腹痛、呼吸困難、體重增加的情形，請立即就醫。
- 服用愛妥糖[®]錠可能造成低血糖症狀請小心(請見低血糖症狀處理方法)。

■ 保存方法

- 請儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

■ 發生低血糖該怎麼辦?

- 症狀：顫抖、心跳加快、冒冷汗、注意力無法集中、異常飢餓、視力模糊、虛弱無力。
- 處理方式：
 1. 血糖值小於70 mg/dl：應立即進食含15公克易吸收含有糖份的食品，如含糖飲料或果汁150毫升、3顆方糖、2包糖包、1大匙蜂蜜、2大匙葡萄乾或葡萄糖錠3顆等。
 2. 15分鐘後若症狀未改善，可再吃一次15公克易吸收含有糖份之食品(同上)；若低血糖症狀一直沒有改善，則應立刻送醫治療。
 3. 如症狀改善，但距離下一餐還有一小時以上，建議喝一杯(240毫升)牛奶或食用一份點心避免再度發生低血糖。若症狀沒有改善，請立即與您的醫師聯絡。
 4. 當低血糖症狀發生時請勿駕車，以免發生危險。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.04
- PFS-7200-0001

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

