

藥品使用指導單

瑪爾胰[®]錠 (Amaryl[®] 2 mg)

■ 藥品成分名

Glimepiride

■ 藥品外觀

淺綠色，橢圓形錠劑兩面有刻痕，錠劑；大小：1.0 公分；標記：[M/S]

■ 作用

治療第二型糖尿病，以控制血糖接近正常值。

■ 用法

- 盡量保持在每日同一時間服用，按照醫生的指示用藥。
- 應在用餐前不久或用餐當中服用。
- 如果是每日服用一次的話，可於早晨服用一次。

■ 注意事項

- 不建議使用於兒童、孕婦、授乳婦女、嚴重肝腎功能異常、乳糖耐受不良、G6PD缺乏(蠶豆症)患者。
- 治療初期可能會有低血糖風險，務必密切注意血糖變化。
- 某些藥物可能會影響本藥品的血糖控制效果，因此若您有其他服用藥物請主動告知醫師或藥師。
- 可能增加您對光線的敏感性，請特別注意防曬。
- 避免飲酒！飲酒可能增強或減弱 glimepiride 降低血糖的作用。
- 本藥品可能會造成血糖變化影響注意力，駕車或操作危險機械時請小心留意。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 可能的副作用

- 腸胃不適、噁心、頭痛、缺乏食慾、體重改變。
- 若症狀持續並無改善，或發生下列症狀請立即與您的醫師聯絡：高燒、失去意識、異常出血、喉嚨痛、皮膚潮紅或發癢起疹、眼睛或皮膚發生黃疸現象、尿液顏色變深。
- 服用瑪爾胰[®]錠可能造成低血糖症狀請小心(請見低血糖症狀處理方法)。

■ 保存方法

- 請儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

■ 發生低血糖該怎麼辦?

- 症狀：顫抖、心跳加快、冒冷汗、注意力無法集中、異常飢餓、視力模糊、虛弱無力。
- 處理方式：
 1. 血糖值小於70 mg/dl：應立即進食含15公克易吸收含有糖份的食品，如含糖飲料或果汁150毫升、3顆方糖、2包糖包、1大匙蜂蜜、2大匙葡萄乾或葡萄糖錠3顆等。
 2. 15分鐘後若症狀未改善，可再吃一次15公克易吸收含有糖份之食品（同上）；若低血糖症狀一直沒有改善，則應立刻送醫治療。
 3. 如症狀改善，但距離下一餐還有一小時以上，建議喝一杯(240毫升)牛奶或食用一份點心避免再度發生低血糖。若症狀沒有改善，請立即與您的醫師聯絡。
 4. 當低血糖症狀發生時請勿駕車，以免發生危險。
 5. 若症狀沒有改善，請立即與您的醫師聯絡。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.04
- PFS-7200-0002

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

