

藥品使用指導單

冠脂妥®膜衣錠 (Crestor® 10 mg)

■ 藥品成分名

Rosuvastatin

■ 藥品外觀

粉橘紅，圓形，錠劑；大小：0.7公分；標記：[ZD4522/10]

■ 作用

降低血中過高的膽固醇，以減少心血管疾病及中風的發作。

■ 用法

本藥每天使用一次，服藥時間早晚不拘，隨餐或空腹均可。請依照醫師指示服用。

■ 注意事項

- 曾對本藥或類似藥物過敏者禁止使用。
- 禁止用於計畫懷孕婦女、孕婦，因為此藥可能會對胎兒造成傷害。
- 不建議使用哺乳婦女，若仍須服用此藥，服藥期間請停止餵乳。
- 有飲酒習慣、肝臟疾病、嚴重腎功能異常患者，請主動告知醫師。
- 若您正在服用下列的藥品，請告知您的醫師或藥師：
 - 抗生素：Azithromycin（日舒錠）、Erythromycin（紅黴素）、Clarithromycin（開羅理黴素）
 - 免疫抑制劑：Cyclosporine（新體睦）
 - 其他降血脂藥品：Gemfibrozil（脂福）、Fenofibrate（祛脂）

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 頭痛、腹瀉、腹痛、嘔吐、胃腸脹氣、便秘
- 若上述情況持續加重，或有下列情形發生，請立即與您的醫師聯絡：異常的肌肉疼痛、肌肉無力、痙攣或不尋常的虛弱感、眼睛或皮膚四周出現黃疸現象、下背部疼痛、皮膚過敏。

■ 保存方法

- 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.04
- PFS-7200-0003

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

