

藥品使用指導單

沛卜淨®錠劑 (PMS-Desmopressin ® 0.1mg)

■ 藥品成分名

Desmopressin

■ 藥品外觀

白色，圓扁形，錠劑；標記：[中央刻痕][0.1]

■ 作用

- 中樞尿崩症
- 原發性夜尿症(限用於7歲以上病患)
- 成人因夜間多尿所導致之夜尿症

■ 用法用量

- 中樞尿崩症：成人及小孩其初始劑量為0.1 mg每天三次，再依患者情況加以調整，每日劑量範圍為0.2 mg至1.2 mg。
- 原發性夜尿症(限用於七歲以上病患)：建議初始劑量為睡前0.2 mg，假如此劑量效果不佳，最高可增加至0.4 mg。治療3個月後需再評估。
- 成人因夜間多尿所導致之夜尿症：建議起始劑量為睡前0.1 mg，假如治療一週後效果不佳，可增加至0.2 mg然後一週後再加至0.4 mg。

■ 注意事項

- 老年人(65歲以上)之初始治療需謹慎評估，建議須在治療前和期間進行血鈉值的監測。
- 若您有在服用抗憂鬱劑、抗癲癇藥物，請事先告知您的醫(藥)師。
- 若您為孕婦或哺乳中的婦女，請事先告知您的醫(藥)師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■可能的副作用

- 常見的副作用為頭痛、暈眩、噁心、口乾、腹痛、體重增加、末梢水腫和過敏等。
- 較罕見的副作用為低血鈉症、痙攣等。
- 上述的症狀若持續且加重，請告知您的醫師或立即就醫。

■保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

■ 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130

■ 制訂單位/日期：藥劑部/ 111.05

■ PFS-7200-0004

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮