

# 藥品使用指導單

## 臟得樂®錠 (Cordarone® 200 mg)

### ■ 藥品成分名

Amiodarone

### ■ 藥品外觀

白色，不規則形，錠劑；大小：1.05 公分；標記：[200]

### ■ 作用

用於治療及預防心律不整

### ■ 用法

- 一般的劑量為每日3錠，但用法用量可能隨個別狀況有差異，請遵照醫師指示服藥。
- 可空腹或飯後服用。
- 服用此藥期間請勿吃葡萄柚或喝葡萄柚汁。

### ■ 注意事項

- 曾對本藥或類似藥物過敏者、甲狀腺機能異常、計畫懷孕婦女、孕婦、授乳婦女及特定病況未放心臟節律器患者，禁止使用此藥。
- 此藥物和許多藥物都可能產生交互作用，請務必告知醫師所有您正在服用的藥品，包括成藥、維他命、中草藥等。
- 若您正服用其他心臟用藥（如：Digoxin）、抗凝血劑（如：Warfarin）、抗癲癇藥（如：Phenytoin），請主動告知您的醫師。
- 若需進行手術、拔牙，或其他緊急治療，請告知醫師您正服用此藥。
- 此藥可能會使皮膚對光線較敏感，出門請做好防曬，且防護措施應維持至停藥後數週至數個月。
- 服用臟得樂®錠期間，請按時回診及定期接受甲狀腺功能及視力檢查。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 想起時儘快服藥，但如果很接近下次服藥時間，則跳過一次，照原來時間服用下一次的劑量。
- 絕不可一次服用雙倍劑量。
- 若忘記服藥 2 次以上，則請詢問醫師如何處理。

## ■ 可能的副作用

症狀	如何處理
噁心、嘔吐、便秘、食慾不振、腹痛	與食物一起服用可減輕
震顫、步行困難、虛弱、睡眠失調、頭痛、性功能障礙、體重減輕、味覺或嗅覺異常、畏光、乾眼、潮紅、上肢或下肢水腫、皮膚對光線敏感或變藍灰色	若症狀持續或嚴重時，請與醫師聯繫
呼吸困難、呼吸急促、呼吸時會痛、腹部腫脹、心跳快或不規則、視力模糊、視力減退、皮膚起水泡或黏膜破損	請立即與醫師聯繫，這些症狀也可能出現在停藥後

## ■ 保存方法

- 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.04
- PFS-7200-0005

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

