

藥品使用指導單

脂易穩®膜衣錠 (Ezetimibe® 10 mg)

■ 藥品成分名

Ezetimibe

■ 藥品外觀

白色橢圓形錠劑，標記【EZT 10】

■ 作用

選擇性抑制膽固醇在腸胃道的吸收，以減少心血管疾病及中風的發作。

■ 用法

- 建議劑量為10毫克，每天服用一次，單獨投與或與statin類藥品合併投與。
- 可以在一天中的任何時候服用，隨餐或空腹均可。
- 用於腎臟功能受損患者時，不需要調整劑量。

■ 注意事項

- 孕婦、哺乳婦女、肝功能不全患者請主動告知醫師。
- 合併服用降膽酸藥物cholestyramine(本院:可利舒散)會使脂易穩藥效降低。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- Ezetimibe 單獨使用：腹痛、腹瀉、脹氣、疲勞
- Ezetimibe 與statin 類藥品合併使用：肝功能指數上升、頭痛、肌痛
- Ezetimibe 與fenofibrate 合併使用：腹痛

■ 保存方法

- 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.04
- PFS-7200-0006

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

