

藥品使用指導單

煩多閃® (Valdoxan® 25mg)

■ 藥品成分名

Agomelatine

■ 藥品外觀

土黃色，橢圓形；大小：0.8公分

■ 作用

成人鬱症之情緒調節劑。

■ 用法

每日1-2粒，睡前服用；可空腹或與食物併服。

■ 注意事項

- 本品禁用於以下患者：對本藥過敏、肝功能不全患者(肝硬化、嚴重肝指數異常)、18歲以下青少年、75歲以上老年人
- 禁止併用藥品包含fluvoxamine、ciprofloxacin等。
- 治療期間，應避免飲酒。
- 服用本藥可能造成暈眩或困倦，駕車或操作器械應謹慎。
- 孕婦或哺乳婦女，請告知醫療人員。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。



■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：頭痛、噁心嘔吐、暈眩、疲倦、焦慮、失眠。
- 使用煩多閃治療期間，若出現肝損傷的症狀，包括深色尿、淺色糞便、眼白或皮膚發黃、右上腹痛、持續疲倦，請立即停用並回診告知醫師。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(於30°C以下)。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.03
- PFS-7200-0008

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

