

藥品使用指導單

抵克糖[®]錠 (Deglu[®] 50 mg)

■ 藥品成分名

Acarbose

■ 藥品外觀

白色，圓形，錠劑；標記：[110 LO]

■ 作用

抵克糖[®]錠用來治療第二型糖尿病患者，並藉由抑制腸道分解雙糖、寡糖及多糖，來延緩飯後血糖上升及降低您血中葡萄糖含量，使血糖維持在正常值。

■ 用法

- 請遵照醫生指示服藥。
- 用餐前服用，或於用餐時與前數口食物一起咬碎吞下。

■ 注意事項

- 若您有以下情形，請告知您的醫（藥）師
 - 若您是孕婦、哺乳中婦女、肝腎疾病、腸道疾病者。
 - 若您對Acarbose或本藥品任一賦形劑過敏。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 副作用

- 常見：腸胃不適、腹瀉、脹氣，若不舒服的症狀持續且加重，請聯絡您的醫師。
- 若發生眼睛、皮膚顏色變黃，請立即就醫
- 單獨服用本藥品不太容易引起低血糖症狀，但在與其它降血糖藥物併用，的情況下若發生急性低血糖症時，必須使用葡萄糖(如：葡萄糖錠)而非蔗糖改善症狀。

■ 保存方法

- 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.01, 111.10修
- PFS-7200-0010

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

