

藥品使用指導單

優列扶膜衣錠 (Urief 4 mg/tab.)

■ 藥品成份名

Silodosin

■ 藥品外觀

白色，橢圓形，錠劑；標記：[SYN/053]

■ 作用

治療前列腺肥大症所伴隨的排尿障礙。

■ 用法用量

- 成人一天2次，一次1顆

■ 注意事項

- 嚴重肝腎功能不良之患者，禁止使用。
- 此藥可能會造成姿勢性低血壓，服藥後避免快速起立或改變姿勢。
- 服藥期間請小心操作儀器或開車。
- 本藥品不適用於女性及兒童。
- 避免與ketoconazole、clarithromycin、itraconazole、ritonavir等藥品併服，避免影響優列扶膜衣錠®之代謝，加重其副作用。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過忘記的，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量

■ 可能的副作用

- 射精障礙、口渴、腹瀉、頭暈、倦怠

■ 藥品儲存處置

- 貯於25°C以下。
- 置於兒童無法觸及之處。使用前後均應放置於兒童無法觸及之處。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

Micromedex、藥品仿單

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130

制訂單位/日期：藥劑部/111.03

PFS-7200-0013

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮