

藥品使用指導單

克栓腸溶糖衣錠(Throne[®] 100 mg)

■ 藥品成分名

Pentoxifylline

■ 藥品外觀

明黃色，圓凸形，錠劑；大小：1.0公分

■ 作用

促進血液循環

■ 用法

通常成人一天三次，整粒吞服(與食物共服)，依個別狀況調整劑量。

■ 注意事項

- 對pentoxifylline和其類似物成分過敏者(如：caffeine, theophylline等)、視網膜出血、急性心肌梗塞者或懷孕中婦女，禁止使用本品。
- 若為哺乳中之婦女因病情而需要服用本品，請暫時停止哺乳。
- 因本品為持續釋放之劑型，故建議整粒吞服，不要剝碎或磨粉服用。
- 若您有肝/腎功能不全的問題，或是有在同時服用warfarin(抗凝血藥物)，請事先告知醫師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：
噁心、嘔吐、腹瀉、頭痛、頭暈、皮膚潮紅。
- 其他不常見不良反應包括：
搔癢、蕁麻疹、血管神經性水腫、心跳加快或低血壓。
- 如果開始服用克栓腸溶糖衣錠後，出現任何讓您困擾的症狀，請立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(於30°C以下)、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.04
- PFS-7200-0014

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

