

藥品使用指導單

痛酸立克[®] (Tonsaric[®] 100mg)

■ 藥品成分名

Allopurinol

■ 藥品外觀

白色，圓形，錠劑；大小：1公分；標記：[TONS；100]

■ 作用

痛風症、痛風性關節炎、尿酸結石、癌症或經化學治療產生之高尿酸血症

■ 用法

- 輕度痛風患者的一般維持劑量為每天100-300mg，可分次服用。
- 中重度者可增加至每天400-600mg。飯後服用可減輕胃腸道刺激。每日最大極量為800mg。

■ 注意事項

- 痛酸立克沒有抗發炎的效果，故不得使用於急性期治療。且使用本品初期，可能會導致急性發作頻率上升，應接受適當抗發炎治療。
- 腎功能不全患者或其他可能影響腎功能之疾病(充血性心臟病、糖尿病、高血壓等)患者，須謹慎使用。
- 若有同時在服用免疫抑制劑(如azathioprine或mercaptopurine)或支氣管擴張劑theophylline、aminophylline者，請事先告知醫師並謹慎使用。
- 建議在治療期間每日攝取2-3公升水份。
- 避免大量飲酒，因為可能增加尿酸濃度並減低藥物的治療效果。
- 如產生皮疹並伴有類似流行性感冒的症狀(顫慄、發燒、肌痛或噁心嘔吐)，請立即通知醫師，這些症狀可能是嚴重過敏反應的徵兆。
- 孕婦或哺乳婦女，請主動告知醫療人員。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。



■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：使用初期急性痛風發作頻率之暫時性增加、過敏性皮膚炎，若發生後無法忍受，請回診告知醫師及藥師進行調整。
- 痛酸立克可能造成極罕見之嚴重皮膚不良反應：皮疹發生的同時或稍後，伴有顫慄、發燒、咽痛；肌痛與疼痛；噁心或嘔吐；口唇有瘡、潰瘍或白色斑點；唇上有出血瘡等。若有以上症狀，請立即停止服用，並盡速回診告知醫師。
- 其他罕見但嚴重的副作用：貧血、粒狀白血球缺乏、血小板減少症、血管炎、肝毒性、腎毒性。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(於30°C以下)、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.03
- PFS-7200-0015

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮