

# 藥品使用指導單

## 思樂康<sup>®</sup>錠 (Seroquel<sup>®</sup> 100、25mg)

### ■ 藥品成分名

Quetiapine

### ■ 藥品外觀

- 100mg：淡黃橙，圓扁形，錠劑；大小：0.90 公分；  
標記：[SEROQUEL，100]
- 25mg：桃紅色，圓形，錠劑；大小：0.6 公分

### ■ 作用

是一種非典型抗精神病藥物，可用於治療精神分裂症或躁鬱症，亦可用於因疾病引起的躁動症狀。

### ■ 用法

- 可於飯前或飯後使用。
- 劑量及用法因人及病情而異，請按醫囑指示用藥，勿自行增減藥量或任意停藥。

### ■ 注意事項

- 對Quetiapine或本藥品賦形劑過敏者，請勿使用此藥。
- 本藥品和許多藥物可能會產生交互作用，因此務必告知醫師及藥師所有您正在服用的藥品，包括成藥、維他命、中草藥等。
- 若您正服用抗癲癇藥（如：Phenytoin）、紅黴素（Erythromycin）、抗黴菌藥（如：Ketoconazole）、其他抗精神病藥物、降血壓藥，請告知您的醫師。
- 服藥期間應避免飲用含酒精類飲料。
- 若哺乳婦女需使用此藥品，請於服藥期間暫停哺乳。
- 孕婦需經過醫師評估才能在懷孕期間使用本藥品。
- 本藥品可能會造成頭暈，動作不協調、視線模糊、困倦，服藥期間請勿開車或操作危險機械。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 可能的副作用

- 常見：頭暈、嗜睡、口乾、輕微無力、便秘、心搏過速、姿勢性低血壓、消化不良，這些症狀通常發生在剛開始服藥或改變劑量時，若症狀持續或嚴重時，請與醫師聯繫。

## ■ 保存方法

- 請儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.04
- PFS-7200-0016

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

