

藥品使用指導單

癲通®長效膜衣錠 (Tegretol® CR 200 mg)

■ 藥品成分名

Carbamazepine

■ 藥品外觀

淺黃橙色，長圓柱形，錠劑；大小：1.22 公分；標記：[C，G][H，C]

■ 作用

- 控制癲癇或痙攣。
- 治療周邊神經病變引起的疼痛，如：三叉神經痛。
- 治療精神病，如：躁鬱症。

■ 用法

- 於飯後服用，可減少腸胃不適。
- 此藥錠為緩釋劑型，可剝半但不可磨粉，若需以鼻胃管餵食，請告知醫師。

■ 注意事項

- 對Carbamazepine或本藥品賦形劑過敏者，請勿使用此藥。
- 本藥品和許多藥物可能會產生交互作用，因此務必告知醫師及藥師所有您正在服用的藥品，包括成藥、維他命、中草藥等。
- 懷孕或計畫懷孕、哺乳婦女，有心血管疾病、肝病、腎病、骨髓機能異常患者，請先告知您的醫師。
- 服藥期間應避免飲用含酒精類飲料。
- 本藥品可能會造成頭暈，動作不協調、視線模糊、困倦，服藥期間請勿開車或操作危險機械。
- 此藥品可能會降低口服避孕藥的效果，請採用其他避孕方式。
- 請勿未經醫師同意突然停藥，此藥品需要經醫師評估後慢慢降低劑量才能停藥。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

症狀	如何處理
頭暈、視線模糊或複視、幻覺、失眠、不安（尤其是孩童）、言語不清、口腔或舌頭有刺激感、陽痿	若症狀持續或嚴重時，請與醫師聯繫
噁心、嘔吐、腹瀉或便秘、腹痛	隨餐服用，若症狀持續或嚴重時請與醫師聯繫
皮膚出現小紫斑、意識混淆、心智改變、言語不清、眼球不自主運動、癲癇發作次數增加、下肢腫脹、不正常出血、肌肉抽搐、心跳異常、呼吸困難、胸痛	若發生這些副作用，請立即停藥並與醫師聯繫
本藥品有可能發生罕見但嚴重的皮膚過敏反應，如史蒂文生氏強生症候群/毒性表皮溶解症不良反應，如出現喉嚨痛、嘴巴破、眼睛癢、皮膚紅疹等，應立即停藥，回診主治醫師。	

■ 保存方法

- 請儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.04
- PFS-7200-0017

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮