

藥品使用指導單

喜克脂[®]錠 (SimvaHEXAL[®] 20 mg)

■ 藥品成分名

Simvastatin

■ 藥品外觀

淡紅橙色，橢圓形，錠劑；大小：1.3公分；標記：[SIM 20]

■ 作用

降低血中過高的膽固醇，以減少心血管疾病及中風的發作。

■ 用法

依照醫師指示，於每天同一時間服用。

■ 注意事項

- 如果有下列情形請先知會醫（藥）師：
 - 對Simvastatin、類似藥物、本藥品賦形劑過敏者。
 - 懷孕或哺乳。
 - 正在服用其他藥物或健康食品者。
 - 有肝腎疾病、肌肉無自主能力病史者。
 - 有大量飲酒習慣的人。
- 若您有正在服用下列的藥品，請告知您的醫師或藥師：
 - 抗凝血劑：Warfarin（歐服寧）
 - 抗生素：Azithromycin（日舒錠）、Erythromycin（紅黴素）、Clarithromycin（開羅理黴素）
 - 免疫抑制劑：Cyclosporine（新體睦）
 - 其他降血脂藥品：Gemfibrozil（脂福）
- 此藥品禁止和葡萄柚汁併服
- 酒精可能會增加此藥的副作用，服藥期間，禁止飲酒。



■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 常見：頭痛、腹瀉、胃腸脹氣、便秘，若發生後無法忍受，請回診告知醫師進行調整。
- 若上述情況持續加重，或有下列情形發生，請立即與您的醫師聯絡：異常的肌肉疼痛、痙攣或無力、眼睛或皮膚四周出現黃疸現象、下背部疼痛、皮膚過敏、疹子。

■ 保存方法

- 請儲存室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.04
- PFS-7200-0018

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

