

藥品使用指導單

脂福[®]錠 (GEMD[®] 600 mg)

■ 藥品成分名

Gemfibrozil

■ 藥品外觀

白色橢圓形錠劑；大小：2 公分；標記：[YSP/123]

■ 作用

降低血中三酸甘油脂 (TG)、不好的膽固醇 (LDL-C) 以及增加好的膽固醇 (HDL-C) 血中濃度，以控制您的血脂接近正常值，可減少心血管疾病發生的機率。

■ 用法

請依照醫師指示用藥，因藥品易受食物影響療效，建議餐前 30 分鐘服藥。

■ 注意事項

- 如果有下列情形請先知會您的醫（藥）師：
 - 正在懷孕或哺乳，或有計畫懷孕者。
 - 正在服用其他藥物或健康食品，尤其是降血脂藥和抗凝血劑。
 - 有膽囊、肝腎疾病、膽結石病史者。
- 曾對Gemfibrozil或類似藥物或本藥品賦形劑過敏者，請勿使用此藥。
- 不建議使用於孩童。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 可能的副作用

- 常見：拉肚子、嘔吐、脹氣、心灼熱感、頭暈，若發生後無法忍受，請回診告知醫師進行調整。
- 若出現肌肉疼痛、不尋常的虛弱感、下背部疼痛、眼睛及皮膚產生黃疸現象、上腹部疼痛或疹子，請停藥並立刻聯絡您的醫生。

■ 保存方法

- 請儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.04
- PFS-7200-0020

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

