

# 藥品使用指導單

## 腹寧朗®膜衣錠 (Primperan® 5 mg)

### ■ 藥品成分名

Metoclopramide

### ■ 藥品外觀

白色，圓扁形，錠劑；大小：0.60 公分；標記：[P5]

### ■ 作用

可用於緩解噁心、嘔吐、胃灼熱、腹部疼痛、脹氣、食慾不振，亦可用來增進腸胃蠕動。

### ■ 用法

- 請遵照醫師指示服藥。
- 建議於飯前半小時服用效果較佳。

### ■ 注意事項

- 對Metoclopramide或本藥品賦形劑過敏者，請勿使用此藥。
- 若患有癲癇、帕金森氏症、出血、腸阻塞疾病、腎上腺瘤等疾病，不適合使用本藥品。
- 懷孕或計畫懷孕、哺乳，有高血壓、心、肝、腎、帕金森氏症、精神方面等疾病，及正服用其他藥物者，請先告知您的醫師。
- 服藥期間應避免飲用含酒精類飲料，酒精易增加藥品昏睡的副作用。
- 本藥品可能會造成頭暈、嗜睡，在未確定此藥對您有何影響之前如需開車或操作危險機械，請務必特別注意。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

症狀	如何處理
便秘或腹瀉、疲倦	若症狀持續或嚴重時，請與醫師聯繫
心跳異常，頭暈，四肢水腫，癲癇發作，嚴重肌肉僵直、手抖、痙攣 臉部、眼睛、舌頭、頸部、頭部的 不自主運動，呼吸困難	請立即與醫師聯繫

## ■ 保存方法

- 請儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 請勿讓他人服用您的藥品。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.04
- PFS-7200-0023

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮