

藥品使用指導單

鐵達寧® 咀嚼錠 (Tedalin® 100mg)

■ 藥品成分名

Fe(OH)₃ polymaltose complex

■ 藥品外觀

灰紫紅色，圓扁形，錠劑；標記：[YCP]

■ 作用

預防及治療鐵質缺乏、貧血症

■ 用法

一般情況下，每天一錠。視需要可增加為每天兩錠，分次服用。於餐前、餐後或進食中服用均可。

■ 注意事項

- 非鐵質缺乏者、鐵質過度負荷或利用障礙者，請勿服用。
- 使用本藥後，排便可能會呈現深黑色，也可能會干擾糞便檢驗結果。
- 制酸劑、茶、咖啡、牛奶、抗生素等可能會干擾鐵質吸收，應與本品間隔至少兩小時，以避免降低療效。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。



■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、便秘。
- 如果服藥後出現任何讓您困擾的症狀，請停用並告知您的醫療人員。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(於30°C以下)、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.03
- PFS-7200-0031

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

