

藥品使用指導單

諾曼癌素[®]糖衣錠 (Aromasin[®] 25mg)

■ 藥品成分名

Exemestane

■ 藥品外觀

白色，圓形，錠劑；大小：0.6 公分，標記：[7663]

■ 作用

停經後婦女之乳癌輔助治療藥品，並預防復發。

■ 用法

- 請遵照醫師指示服用，勿任意更改劑量或停藥。
- 一般為每天服用一錠，含有脂肪的食物可增加藥品的吸收，建議飯後服用。

■ 注意事項

- 對Exemestane或本藥品賦形劑過敏者，請勿使用此藥。
- 不適用於停經前婦女。
- 孕婦及授乳婦女禁止使用。
- 有肝、腎、心臟疾病或骨質疏鬆，請事先告知您的醫生及藥師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 臉熱潮紅、噁心、疲勞、口水增加、食慾增加、水腫、抑鬱、頭暈、頭痛、疲倦、虛弱、落髮；肌肉、關節或骨頭痠痛、食慾不振、失眠，若發生後無法忍受或症狀加劇，請回診告知醫師進行調整。

■ 保存方法

- 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.04
- PFS-7200-0038

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

