

# 藥品使用指導單

## 可其而<sup>®</sup>錠 (Coochil<sup>®</sup> 10 mg)

### ■ 藥品成分名

Dicyclomine HCl

### ■ 藥品外觀

白色，橢圓形，錠劑；大小：0.8 公分；標記：刻痕

### ■ 作用

用於緩解腸胃道痙攣或潰瘍、膽道痙攣及尿路痙攣

### ■ 用法

- 盡量在每日同一時間服藥。
- 請依藥袋指示服用或按照醫師的指示服用。

### ■ 注意事項

- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知醫生及藥師。
- 若有前列腺肥大、幽門狹窄者請告知醫生。
- 小於六個月之新生兒請勿投與此藥。
- 青光眼之患者，如有必要時請詳予診察，審慎投與。
- 此藥物可能會造成嗜睡及視力模糊，服藥期間請避免從事需精神集中或視力敏銳之工作，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。尤其是老年人，請特別注意。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用過於擔心：口乾、輕度暈眩、食慾不振、嘔吐、視線模糊、嗜睡。
- 當上述的症狀若持續且加重，請立即就醫！

## ■ 保存方法

- 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.04
- PFS-7200-0041

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

