

藥品使用指導單

衛喜康[®]膜衣錠 (Vesicare 5mg)

■ 藥品成分名

Solifenacin succinate

■ 藥品外觀

淡黃色圓形膜衣錠，標記：[特殊標記/150]

■ 作用

膀胱過動症引起之急迫性尿失禁、頻尿及尿急等症狀治療。

■ 用法用量

建議劑量為一天一次，可隨餐或空腹服用。

■ 注意事項

- 若您有以下情形，請告知您的醫(藥)師：
 - 孕婦、哺乳中婦女。
 - 若您對本藥成份或其他賦形劑過敏者。
 - 膀胱出口阻塞、胃腸道阻塞、狹角性青光眼、重度肝腎疾病患者。
 - 若您有服用其它藥物或保健食品(包括自行在藥房購買的)。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 最常見的副作用為口乾、便秘、乾眼、視力模糊及尿液滯留。
- 若出現上述情況且持續加重，請立即與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

■ 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130

■ 制訂單位/日期：藥劑部/112.02

■ PFS-7200-0044

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮