

# 藥品使用指導單

## 樂命達®錠 (Lamictal® 50 mg)

### ■ 藥品成分名

Lamotrigine

### ■ 藥品外觀

淡黃橙色，正方形，錠劑，大小：0.75 公分，標記：[LAMICTAL，50]

### ■ 作用

- 單獨或與其他藥品一起使用治療並預防癲癇發作
- 情緒穩定劑

### ■ 用法

- 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
- 可於飯前或是飯後服用。

### ■ 注意事項

- 若您計畫（已）懷孕或是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 此藥物會分泌至母乳中，有哺乳需求的婦女，應先告知您的醫生及藥師。
- 定期回診讓醫生評估治療成效，若需調整劑量、停藥或改用其他藥物，請以醫師指示的方式調整。
- 服藥期間應避免飲用含酒精類飲料。
- 此藥物可能會造成暈眩、嗜睡、視力模糊狀況，服藥期間請避免操作機器或開車。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 較常見：頭痛、嗜睡、暈眩、視力模糊、易怒、食慾不振、噁心嘔吐等，若發生後無法忍受或症狀加劇，請回診告知醫師進行調整。
- 可能發生罕見但嚴重之皮膚不良反應，如有喉嚨痛、嘴破、皮膚疹應立即就醫。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

## ■ 可能增加跌倒的風險

- 服用此藥物可能會產生暈眩、嗜睡、視力模糊等副作用，可能增加跌倒風險，請多加注意。
- 患者若癲癇發作時，也會增加跌倒風險。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 111.04
- PFS-7200-0045

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮