

藥品使用指導單

可蘇多[®]錠 (Casodex[®] 50 mg)

■ 藥品成分名

Bicalutamide

■ 藥品外觀

白色，圓扁形，錠劑；大小：0.65 公分；標記：[Cdx, 50][特殊標記]

■ 作用

用於治療攝護腺癌。

■ 用法

- 劑量及用法因病情而異，請按醫囑指示用藥，勿自行增減藥量或停藥。
- 一般使用劑量：每天一次，每次一錠，於固定時間服用。

■ 注意事項

- 本藥品禁止用於女性、孕婦、授乳婦女及孩童。
- 本藥品禁止與Terfenadine、Astemizole、Cisapride併用，可能提高心律異常風險。
- 乳糖、葡萄糖吸收或代謝異常患者不應使用本藥品。
- 有肝、腎、心臟疾病，應主動告知醫生及藥師。
- 服藥期間及治療完成後130天內，建議病人及其伴侶採取適當的避孕措施。
- 若正服用其它藥品，特別是抗凝血劑（如可化凝、歐服寧），請告知醫師及藥師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 常見：貧血、食慾減退、性慾減退、頭暈、熱潮紅、腸胃不適、禿髮、多毛症、血尿、體重增加、便秘、腹瀉等，若發生後無法忍受或症狀加劇，請回診告知醫師進行調整。
- 本藥品可能影響肝功能，如有下列症狀：噁心嘔吐、食慾不振、手腳水腫、眼睛或皮膚變黃、胸悶胸痛、虛弱，請先停藥並盡速回診告知醫師。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.04
- PFS-7200-0046

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

