

# 藥品使用指導單

## 喜革脈®錠 (Sigmart® 5mg)

### ■ 藥品成份名

Nicorandil

### ■ 藥品外觀

白色，圓扁形，錠劑；大小：0.5公分；標記：[C-21F，5]

### ■ 作用

具有冠狀動脈擴張效果，可使冠狀血管血流量增加及緩解痙攣。適用於狹心症。

### ■ 用法用量

通常成人一日用量為15 mg，分三次口服。可根據症狀輕重調整劑量。

### ■ 注意事項

- 嚴重肝功能不良者、嚴重心衰竭患者、青光眼患者或G6PD缺乏(蠶豆症)者，應謹慎使用。
- 本品可能會引起低血壓。若同時服用降血壓藥物或具有降血壓作用的其他藥物(如血管擴張劑、三環類抗抑鬱藥、酒精)，可能會加重低血壓的風險。應注意是否有不良反應產生。
- 對於服用PDE-5抑制劑(sildenafil、vardenafil、tadalafil)以治療勃起障礙之患者或服用GC激活劑(riociguat)以緩解肺高壓症狀之患者，請勿併用本品。
- 因尚未有相關安全性資料，孕婦及可能懷孕的婦女請主動告知醫師。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請儘速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過忘記的，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 常見的副作用：頭痛、暈眩、噁心、嘔吐、顏面潮紅及倦怠。
- 罕見但嚴重之副作用包括肝功能障礙、黃疸、血小板減少、口舌潰瘍、肛門及消化道潰瘍。若有以上症狀，請停止服用，並即早回診告知醫師。

## ■ 藥品儲存處置

- 儲存於室溫乾燥處。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

Micromedex、藥品仿單

諮詢電話：(02)2737-2181 分機 8130

制訂單位/日期：藥劑部/111.03

PFS-7200-0047

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮