

藥品使用指導單

莫鼻卡[®]持續性藥效錠 (Lorapseudo[®] SR)

■ 藥品成分名

Loratadine 5 mg/ Pseudoephedrine sulfate 120 mg

■ 藥品外觀

白色圓形雙凸錠；大小：1.0 公分；標記：[無特殊標記]。

■ 作用

此藥品為複方產品，主要緩解過敏性鼻炎及感冒的相關症狀，如鼻塞、打噴嚏、流鼻水、搔癢及流眼淚。

■ 用法

- 請遵照醫生或藥師的指示服用藥物。
- 請整顆吞服，不可磨粉、剝半或嚼碎。

■ 注意事項

- 本藥品適用於成人及12歲以上孩童。
- 甲狀腺機能亢進、狹角性青光眼、尿滯留、重度高血壓、重度冠狀動脈疾病患者，應避免使用。
- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或是有肝、腎、心臟疾病，應告知醫生及藥師。
- 若同時併服單胺氧化酶抑制劑（抗憂鬱藥），可能會增加血壓上升風險。
- 本藥品可能造成嗜睡、注意力下降，使用後應避免開車及操作機械等危險動作。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，只需服用下次藥物，不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 常見：失眠、口乾、嗜睡、疲倦、頭痛、口渴、失眠、心跳過速等，若症狀持續且加重，請回診告知醫師進行調整。
- 若有下列少見的情形：臉、唇或喉嚨水腫、不明原因發燒、畏寒、不規則心跳或心跳快速、呼吸困難或抽搐等，請立即停藥並就醫。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.04
- PFS-7200-0048

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

