

藥品使用指導單

帝拔癲[®]持續藥效錠 (Depakine[®] Chrono 500 mg)

■ 藥品成分名

Valproate sodium

■ 藥品外觀

白色，圓形，雙凸錠劑；大小：1.8 公分

■ 作用

- 治療各種癲癇發作
- 治療躁鬱症的急性躁症
- 預防偏頭痛

■ 用法

- 建議與餐點同時服用。
- 請整顆吞服，不可磨粉或嚼碎，可撥半。
- 未與醫師諮詢前，請勿自行停藥。

■ 注意事項

- 本藥品具高度致畸性，因此不應使用在具生育能力女性病患，應諮詢專業醫療人員，採行有效之避孕措施；如發現可能懷孕或計畫懷孕，請立即告知醫師。
- 本藥品不適用於六歲以下或體重17公斤以下之兒童。
- 有POLG相關疾病、尿素循環代謝異常、肝臟疾病請主動告知醫師。
- 本藥品禁止與mefloquine(瘧疾用藥)和St.-John's-Wort(貫葉連翹/金絲桃)併用。本藥品易與其他藥品產生交互作用，若您需使用其他藥品，請事先諮詢醫師及藥師。
- 治療期間不建議服用酒精性飲料。
- 服藥期間應定期檢查肝功能。
- 服用期間應避免從事高度專注力的活動，如開車或操作機械。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，只需服用下次藥物，不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 常見：噁心、嘔吐、腸胃不適、暫時性掉髮、體重增加、意識改變、聽力異常、尿失禁等，若上述症狀若持續且加重，請回診告知醫師進行調整。
- 若有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：嚴重嘔吐、不正常出血、皮膚紅腫、癲癇發作頻率增加。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.04
- PFS-7200-0050

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

