

# 藥品使用指導單

## 待匹力達糖衣錠 (Dipyridamole® 25mg)

### ■ 藥品成分名

Dipyridamole

### ■ 藥品外觀

橙色，圓形，雙凸錠劑；大小：0.6公分；標記：[STD 129]

### ■ 作用

預防血栓、治療慢性狹心症

### ■ 用法

- 治療慢性狹心症：
  - 劑量：一天3次，每次25mg
- 宜空腹時(即飯前一小時或飯後兩小時)配大量水(240mL)以幫助快速吸收
- 飯中或飯後服藥可降低腸胃刺激性

### ■ 注意事項

- 若您血壓較低，使用時應小心。
- 本藥品用於心絞痛的預防上可能須2-3個月才能達到充分療效，請您務必按照醫師指示正確用藥，勿自行停藥。
- 治療期間，在改變姿勢時(從躺臥或坐姿起立時)應小心並放慢速度。
- 本藥品不能用於緩解急性心絞痛。
- 若您為孕婦或是授乳婦，由於本藥品用於此族群的安全性尚未確立，使用前須經由醫師評估。

### ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 本藥品常見的副作用包含眩暈、噁心、頭痛、肌肉痛、胃絞痛或虛弱等。副作用通常會隨著治療時間的拉長而消失，但若副作用持續，應及早回診告知醫師。
- 本藥品具血管擴張作用，可能會造成低血壓、熱潮紅、及心跳加速。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.03
- PFS-7200-0052

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

