

# 藥品使用指導單

## 福避痛錠 (Feburic® 80mg)

### ■ 藥品成分名

Febuxostat

### ■ 藥品外觀

淺黃至黃色膠囊形膜衣錠, 標記: 80

### ■ 作用

慢性痛風、因化療發生腫瘤溶解症候群的高尿酸血症

### ■ 用法

- 常用劑量：每次1-2錠，每天一次。視症狀改善程度增減用量。
- 治療期間無須顧慮食物或制酸劑(如胃藥)的使用

### ■ 注意事項

- 福避痛錠禁止使用於下列族群：
  - 接受Azathioprine或mercaptopurine治療的病人，以免產生交互作用。
- 孕婦、授乳婦女、未滿18歲之病患使用前需經過醫師評估。
- 使用福避痛錠可能會導致痛風發作(由於尿酸在組織進行轉移)，您可以在醫師的同意下使用非類固醇類消炎止痛藥或是預防性使用秋水仙素以避免痛風發作。
- 研究指出使用福必痛錠的心血管事件發生率有上升的現象，其原因和關聯性尚不明確。請您在接受治療期間，密切觀察自身心肌梗塞和中風的徵象和症狀(如:胸痛、呼吸短促、頭昏腦脹、噁心、想吐等)。
- 若治療期間出現可能表示有肝損傷的症狀，如疲勞、食慾減退、右上腹不適、尿色變深或黃疸，應立即告知醫師並檢驗肝功能。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

## ■ 可能的副作用

- 肝功能異常、噁心、關節痛、皮疹。
- 如果開始服用福避痛錠後出現任何讓您困擾的症狀，請停藥並立刻與您的醫療人員聯絡。

## ■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

## ■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(30°C以下)、避光保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.03
- PFS-7200-0058

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

