

藥品使用指導單

服爾伊得安[®]錠 (Fluitran[®] 2 mg)

■ 藥品成分名

Trichlormethiazide

■ 藥品外觀

淡紫紅色，圓扁形，錠劑；大小：0.7 公分；標記：[S]

■ 作用

服爾伊得安[®]錠為口服的利尿劑，主要治療高血壓。

■ 用法

- 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用
- 請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。

■ 注意事項

- 有糖尿病或痛風傾向之患者，偶會引起糖質與尿酸之代謝或排泄之異常，需注意。
- 肝硬化患者、腎功能障礙之患者，以及需連續大量使用此藥品者須特別小心使用。
- 服用此藥會引起尿量增加，所以請於白天服用(盡量在中午前)，可以減少睡眠干擾。
- 降壓作用可能引起頭暈目眩，於高處工作、開車等伴隨危險之機器操作者，須特別留意。
- 不建議哺餵母乳。

忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥，不可一次服用雙倍的藥量。
- 若是已經忘記服藥太多次時請回診就醫。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：噁心、嘔吐、便秘、顏面潮紅、光線過敏、皮膚發疹、倦怠感、心悸、輕微痙攣。
- 上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：心跳不規律、肌肉抽搐、四肢無力等症狀，請立刻聯絡您的醫師。
- 服用服爾伊德安[®]錠可能會增加病患如廁的頻率，如廁的整個過程須謹慎預防跌倒。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 鋁箔包裝是為了外盒開封後避光保存用，錠劑表面照光後可能會褪色(顏色的變化不影響主成份含量)。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.07
- PFS-7200-0062

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

