

藥品使用指導單

癌微可[®]錠 (Ivic[®] F.C. 100 mg)

■ 藥品成分名

Imatinib

■ 藥品外觀

棕色橢圓形錠劑；標記：[IMA]

■ 作用

癌微可[®]錠會干擾您體內癌細胞的生長，可用於治療癌症，如：骨髓性白血病或胃腸基質瘤。亦可用於治療其他的疾病，如：嗜伊紅性白血球增加症候群，若需進一步資訊，可請教您的醫（藥）師。

■ 用法

- 按照醫生的指示時間服用。
- 無法吞服膜衣錠之病人，可將1顆錠劑泡在至少50毫升的水或果汁（若2顆則至少100毫升，以此類推）中服用，懸浮液應在錠劑崩解後立即服用。

■ 注意事項

- 若您對於 Imatinib 或任何其他藥物過敏，請告知您的醫（藥）師。
- 若您（曾）有肝臟疾病、心臟疾病、甲狀腺機能低下，請告知您的醫師。
- 服藥期間可能會發生如頭昏，視線模糊或是嗜睡的不良反應，因此應建議病人若需開車或操作精密之儀器或機械應格外小心。
- 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
- 服藥期間避免食用葡萄柚。
- 本藥品與其他經肝臟代謝之藥物可能有交互作用，若須併用其他藥物前請務必諮詢您的醫（藥）師。
- 治療期間，可能影響免疫力，出入公共場所請務必注意衛生。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥，不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：皮膚起紅疹、糞便或尿液顏色變深、肌肉痠痛、噁心嘔吐、食慾不振、胃痛、腹瀉、便秘、味覺障礙、視力模糊、咳嗽、寒顫、喉嚨痛、體重突然減輕或增加、頭暈、頭痛、失眠、心悸。
- 當上述的症狀若持續且加重，請告知您的醫師或立即就醫！

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.07
- PFS-7200-0064

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮