

藥品使用指導單

安樂平®錠 (Halopin® 0.75 mg)

■ 藥品成分名

Haloperidol

■ 藥品外觀

白色，圓凸形，錠劑；大小：0.55 公分；無特殊標記

■ 作用

安樂平®錠可用來調整精神狀態，例如躁症、攻擊性與破壞性之行為障礙。

■ 用法

請依藥袋指示服用或按照醫師的指示服用。

■ 注意事項

- 若有肝、腎、心臟疾病、巴金森氏症、低血壓、癲癇、甲狀腺機能亢進，應告知您的醫生及藥師。
- 懷孕或授乳婦應避免使用此藥品。
- 服用藥物可能造成眩暈、視力模糊、嗜睡，請避免開車或操作精密儀器或機械。
- 服用此藥期間應避免抽菸、喝酒。
- 服用此藥初期、劑量有改變時，容易有眩暈、視力模糊，甚至肌肉僵硬、行動緩慢。請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。尤其是老年人，請特別注意。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：便秘、口乾、眩暈、視力模糊、血壓下降、冒汗、食慾不振、噁心嘔吐。
- 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：肌肉緊張異常、焦躁不安、或類似巴金森氏症狀：可能會肌肉僵硬、行動緩慢、手抖、流口水、大舌頭的情形，請立即就醫！

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.07
- PFS-7200-0067

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮