

藥品使用指導單

普治敏[®]錠 (Lonzumín[®] 25 mg)

■ 藥品成分名

Buclizine dihydrochloride

■ 藥品外觀

白色，圓形，錠劑；大小：0.6 公分

■ 作用

普治敏[®]錠為口服的抗組織胺藥物，用於治療過敏引起之搔癢、皮膚癢疹，或過敏性鼻炎，也可用於預防或緩解暈車、暈船引起之噁心嘔吐。

■ 用法

- 請於飯後服用。
- 若為一天一次宜於晚上或睡前服用。
- 若為防止暈車、暈船，應於出發前一小時服用。
- 5-12歲小孩劑量應減半。

■ 注意事項

- 幼兒安全劑量尚未完全建立，應經醫師藥師指示使用。三歲以下嬰幼兒應避免使用。
- 有以下情形之患者服藥前請告知醫師：慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難的人。
- 有服用其它鎮靜安眠藥或感冒藥者，服用此藥前請告知您的醫師。
- 孕婦或授乳者不建議使用本藥。
- 從事駕駛及操作重型機械者，請謹慎使用，預防意外發生。
- 由於本藥可能引起嗜睡，避免因注意力不集中，造成跌倒情形發生。
- 服用期間避免喝酒。
- 如需服用超過兩次以上，必須至少間隔4小時。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

■ 可能的副作用

- 此藥可能會有嗜睡、口乾、頭痛、緊張、食慾不振等現象，若有上述情形不必驚慌，可於睡前服用，可避免這些不便。
- 服藥後若出現視覺模糊、視覺顏色異常等情況，請停止用藥並諮詢您的醫(藥)師。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.07
- PFS-7200-0074

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮