

藥品使用指導單

蕾莎瓦®膜衣錠 (Nexavar® 200 mg)

■ 藥品成分名

Sorafenib

■ 藥品外觀

淡紅色，圓扁形，錠劑；大小：1.0 公分；標記：[特殊標記][200]

■ 作用

蕾莎瓦®膜衣錠為作用在腫瘤細胞上，抑制癌細胞生長。

■ 用法

- 盡量保持在每日同一時間服用。
- 必須空腹服用，建議飯前一小時或飯後兩小時服用。

■ 注意事項

- 若您對於此類藥物或有任何其他藥物過敏，請告知您的醫（藥）師。
- 有肝、心臟疾病，應告知您的醫（藥）師。
- 若您有服用以下藥物，如：阿斯匹靈、止痛劑、抗凝血劑等，請告知您的醫（藥）師。
- 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
- 治療期間可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
- 當您有手或腳水腫時，建議可穿棉襪或軟鞋，以避免患處受到過多的壓力，並應避免長時間站立。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 常見副作用：噁心嘔吐、食慾不振、胃痛、腹瀉、便秘、體重減輕、落髮、頭暈、倦怠、手足皮膚反應。
- 若有以下情況，請告知您的醫師：皮膚大量起紅疹、手或腳水腫、視力模糊、胸悶胸痛、異常高血壓、心悸、糞便或尿液顏色變深。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請勿隨意丟棄，請拿到醫院或藥局做回收。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.07
- PFS-7200-0082

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

