

藥品使用指導單

骨敏捷® (Mobic® 15mg)

■ 藥品成分名

Meloxicam

■ 藥品外觀

淡黃色，圓形，錠劑；標記：[77C；77C]

■ 作用

非類固醇消炎止痛藥，多適用於類風溼性關節炎、骨關節炎或僵直性脊椎炎。

■ 用法

每日0.5-1粒，請勿空腹使用。

■ 注意事項

- 對meloxicam過敏、半乳糖不耐症、近期有胃潰瘍或出血、腦出血、全身出血性疾病或嚴重肝腎功能不全者、孕婦或哺乳婦女，禁止使用。
- 與水楊酸(Acetylsalicylic acid)、其他NSAID藥物有可能產生交叉過敏。
- 備孕、受孕困難或接受生殖能力檢查之婦女，不建議使用。
- 授乳婦女及孕婦，禁止使用。
- 對其他非類固醇消炎止痛藥過敏、曾患腸胃疾病、心血管疾病或正在服用抗凝血劑病患，須謹慎使用。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。



■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：腸胃不適、腹瀉、便秘、噁心嘔吐、過敏反應、暈眩、頭痛。
- 骨敏捷可能造成極罕見之嚴重皮膚不良反應，多發生於開始治療一個月內。若皮疹發生的同時，有黏膜受損、顫慄、發燒、肌痛或噁心嘔吐，請立即停止服用，並盡速回診告知醫師。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(30°C以下)。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 111.03
- PFS-7200-0083

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

