

藥品使用指導單

諾安命[®]錠 (Novamin[®] 5 mg)

■ 藥品成分名

Prochlorperazine

■ 藥品外觀

白色，圓扁形，錠劑；大小：0.7 公分；標記：[095]

■ 作用

諾安命[®]錠主要之臨床用途有止吐、鎮靜、調整精神狀態。

■ 用法

- 作為止吐用藥時可視情況停藥。
- 本藥須視需要或耐藥性需逐漸調整劑量，可與食物併服以降低對胃的刺激性。

■ 注意事項

- 若您有計畫（已）懷孕、哺乳、心血管疾病、青光眼、肝功能障礙、巴金森氏症、消化性潰瘍、前列腺肥大請告知您的醫師或藥師。
- 服用本藥後一小時內不可服用制酸劑或瀉劑。
- 使用本藥可能會影響駕駛和機械操作能力，若有相關活動時請加以注意。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：視力模糊，便秘，思睡，暈眩。
- 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：肌肉痙攣，頭臉部抽搐動作，手與指頭顫抖與搖晃，血壓過低，發燒，眼睛皮膚變黃等情形，請立即就醫！

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位 / 日期：藥劑部 / 110.01, 111.10修
- PFS-7200-0085

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮