

藥品使用指導單

樂伯克錠® (Mirapex® 1mg)

樂伯克持續性藥效錠® (Mirapex® PR 0.375/1.5 mg)

■ 藥品成分名

Pramipexole

■ 藥品外觀

Mirapex 1mg：白色，圓形，錠劑，標記：[P9/P9][特殊標記]

Mirapex PR 0.375mg：白色，圓形，錠劑；標記：[P1][特殊標記]

Mirapex PR 1.5mg：白色，橢圓形，錠劑；標記：[P3][特殊標記]

■ 作用

巴金森氏症、腿部躁動症

■ 用法

- 空腹用藥或與食物併用均可
- 用於腿部躁動症時，可於睡前2-3小時服用。
- 巴金森氏症：可根據個人病況逐漸調高劑量，最多增至1.5 mg，一天三次。
- 持續性藥效錠(Mirapex® PR 0.375/1.5 mg)必須整顆吞服，不可嚼碎、壓碎或切割。

■ 注意事項

- 服用本藥可能造成困倦嗜睡，駕車或操作器械應謹慎。
- 服用本藥可能造成起立型低血壓症，改變姿勢時需放慢動作。
- 若出現噁心症狀，將藥品與食物一起服用，可能有助減少腸胃不適的發生。
- 服用本藥可能會產生幻覺，而且老年病患的危險性較高。
- 腎功能不全患者、孕婦或哺乳婦女請主動告知醫師
- 若有服用多巴胺拮抗劑(例如抗精神疾病藥物或metoclopramide)、成藥、保健食品、中草藥等，請先告知醫師。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 較常見的副作用：噁心、便秘、頭暈、頭痛、嗜睡、姿勢性低血壓、運動障礙、食慾增加。
- 若出現日間嚴重瞌睡或於須主動參與的活動(如對話、飲食等)中睡著，請先停藥並盡速回診告知醫師。
- 如果開始服用樂伯克錠後，出現任何讓您困擾的症狀，請立刻與您的醫療人員聯絡。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處(於30 °C 以下)。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部/111.03
- PFS-7200-0086

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮