

藥品使用指導單

來喜妥®錠 (Rasitol® 40 mg)

■ 藥品成分名

Furosemide

■ 藥品外觀

淡綠色，橢圓形，錠劑；大小：0.88 公分；標記：[YSP126]

■ 作用

來喜妥®錠為口服的利尿劑，主要用來治療高血壓、充血性心衰竭、消除水腫。

■ 用法

- 請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。
- 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
- 若為每日服用一次，則建議在早上服用，盡量勿在就寢前使用來喜妥®錠，以避免因頻尿而影響睡眠。

■ 注意事項

- 請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
- 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 授乳婦女禁止使用來喜妥®錠。
- 若您有肝腎方面的疾病，請告知您的醫(藥)師。
- 對磺胺類藥物過敏者請小心使用。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：心跳加快、失眠、腸胃不適、噁心嘔吐。
- 如出現聽力喪失、皮膚嚴重過敏(紅疹、脫皮)等情形請盡速就醫。
- 服用本藥品可能會增加病患如廁的頻率，須小心預防跌倒的發生。

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0090

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮