

藥品使用指導單

理思必妥[®]錠 (Risperdal[®] 3 mg)

■ 藥品成分名

Risperidone

■ 藥品外觀

鮮黃色，長圓柱形，錠劑；大小：1.4 公分；標記：[Ris，3]

■ 作用

理思必妥[®]錠為抗精神病藥物，主要作用為調整精神狀態

■ 用法

- 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
- 如果是每日服用一次的話，可於早晨服用；如果是分成每日兩次服用的話，可於早晨和傍晚各服用一次。

■ 注意事項

- 若您本身有心臟血管相關疾病或風險因子、肝腎功能不全等狀況，請主動告知您的醫(藥)師。
- 若您同時有在服用其他抗精神病藥物、利尿劑等，請事先告知您的醫師。
- 懷孕、哺乳婦女不建議使用此藥。
- 使用本藥可能會影響駕駛和機械操作能力，執行此類動作時請加以注意。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮

■ 可能的副作用

- 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用驚慌：失眠、躁動不安、焦慮、頭痛、體重增加。
- 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：嗜眠、視力模糊、高燒、肌肉僵直等請立即就醫！

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0091

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮