

藥品使用指導單

便通樂[®]膜衣錠 (Through[®] Tablets 12mg)

■ 藥品成分名

Sennoside A+B

■ 藥品外觀

土黃色，圓形，錠劑；大小：0.70 公分。

■ 作用

便通樂[®]錠作用為直接刺激大腸壁，促進大腸蠕動，產生緩瀉作用。

■ 用法

- 便通樂[®]錠作用較緩慢，因此在就寢前(或空腹時)服用，翌晨即可有效果。
- 成人一日可服用 1-2 錠，可依年齡、症狀適量增減。

■ 注意事項

- 長期使用會產生依賴，使腸道失去原有機能及電解質失衡，請多補充水分及膳食纖維以幫助排便。
- 使用緩瀉劑會增加病患如廁頻率，故在病患上下床間請攙扶以防跌到，病患於如廁時應注意地板是否積水以防滑倒。
- 若排便恢復正常，即可停藥。

■ 忘記服藥怎麼辦？

- 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 若已經接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥量。
- 切記不可一次服用雙倍的藥量。



■ 可能的副作用

- 如有下列常見之副作用請不用驚慌：腹絞痛、打嗝、噁心，電解質失衡等。
- 服藥後若出現如虛弱、暈眩、心悸、劇烈絞痛、血便或肛門出血等情況，請立即停藥並就醫！

■ 保存方法

- 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
- 避免放在孩童可以取得的場所。
- 若藥品超過保存期限請丟棄。
- 勿將您的藥物提供給他人使用。

參考資料：

藥品仿單、Micromedex

- 諮詢電話：(02) 2737-2181 分機 8130
- 制訂單位/日期：藥劑部 / 110.01, 111.10 修
- PFS-7200-0095

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。



以病家為尊、以同仁為重、以北醫為榮